

野ねずみ一斉駆除の実施について

～正しい使い方と注意事項～

○ 使用する殺そ剤：野そ用殺そ剤 メリーネコリン化亜鉛



○ 毒 性：普通物

○ 使 い 方：


- 本剤を10a当たり小袋(2g)25包使用してください。
- 野ネズミの穴に小袋を破らずにそのまま入れてください。
- 殺そ剤がなくなったら再度補充すると効果的です。
- 休耕地なども駆除してください。
- 農地や山林に加えて納屋の駆除にも使用できます。

**倉庫・納屋に使用する場合は食べ物等への混入に
十分注意してください。**


- 早朝か夕方の駆除が最も効果的です。



ソ穴(ねずみの穴)に投入する



樹間や根元に一定間隔(格子状)に配置する



物陰に数か所配置する

○ **メリーネコリン化亜鉛の特長：**

- 野ネズミが1回食べると、およそ3時間で死亡します。
- 毒性は毒劇物ではなく普通物であり、毒性は低く抑えられています。
- 死んだ野ネズミをペットが食べた場合でも、安全性の高い殺そ剤です。



注意事項

- 駆除では必ず手袋を着用してください(ネズミは人間の臭いを嫌います)。
- 配布された全量を実施期間内で全て使用してください。
- 家ネズミには絶対に使用しないでください(納屋の駆除には使用できます)。

● 誤って本剤を食べてしまった場合の対処方法

- 速やかに医師の診断を受けてください。
- 医師の診断により、過マンガン酸カリウム液(0.3%)で胃を洗浄し、炭酸水素ナトリウム液を内服してください。